



Aktuelle Studien am Onkologischen Zentrum

Darmzentrum

AIO 18.2

Randomisierte Phase III Studie mit einer präoperativen FOLFOX Therapie versus einer postoperativen Risiko-adaptierten Chemotherapie für Patienten mit einem lokal fortgeschrittenem Rektumkarzinom.und einem niedrigen Risiko für lokales Versagen – adjuvant/neoadjuvant

Azurite

Register beim metastasierten kolorektalen Karzinom – aktuell Rekrutierungspause

Colopredict Plus 2.0, Register (Diak)

Ein nicht-interventionelles, multizentrisches molekulares Register für Patienten mit Kolonkarzinom im Stadium I, II oder III. Die Patienten werden retrospektiv und prospektiv anhand ihrer klinischen und histopathologischen Diagnose eingeschlossen -adjuvant

Fruquent

Fruquintinib in patients with metastatic colorectal cancer: A prospective, multicenter, observational study

Im Follow-up - Rekrutierung beendet

BNT000-001 (Diak)

Epidemiologische Studie zur Überwachung von Studienteilnehmern mit reseziertem kolorektalem Karzinom im Stadium II (hohes Risiko) oder Stadium III auf zirkulierende Tumor-DNA vor, während und nach ihrer Behandlung mit adjuvanter Chemotherapie -adjuvant

Stand: 09-2025